

6

D E
ANEURYSMATE VARICOSO.
T H E S E S
ANATOMICO-CHIRURGICÆ.

QUAS, DEO JUVANTE, & *Præfide* M. FRANCISCO CHO-
PART, *scholarum Moderatore designato, Professore Regio,*
Consiliario & antiquo Academia Regiæ Chirurgiæ pro com-
mercio litterarum extraneo Commissario, tueri conabitur JA-
COBUS RENATUS DUVAL, Argentomæus, Artium libera-
lium in almâ Universitate Cadomensi Magister, nuper in
scholis Chirurgiæ præcticis alumnus, & Theseos auctor.

Die Luna 12^a mensis Junii, anno 1786, à sesqui-secundâ
post meridiem ad septimam.

P A R I S I I S,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.
PRO ACTU PUBLICO,
MAGISTERII LAUREA.



Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ
Collegii, necnon Academiæ Typographi, viâ Cythareâ.

M. DCC. LXXXVI.


ANATOMICO-CHIRURGICAE
PROBATISSIMO VIRO,
REBUS IN CHIRURGICIS INCLYTO,
D.D. JOANNI DE LA PORTE
ANTIQUO COLLEGII PRÆPOSITO ET QUÆSTORI,
REGIÆ CHIRURGICÆ ACADEMIÆ CONSILIARIO,
IN GRATI ANIMI MEMORIAM,
HOS-CE LABORUM FRUCTUS
DICAT, VOVET ET CONSECRAT

PRO ACTU PUBLICO
EJUS DEDITISSIMUS ALUMNUS

J. R. DUVAL.

Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgici
Collegii, necnon Academiæ Typographi, vii Cythereæ.

ML DCC LXXXVI



D E

ANEURYSMATE VARICOSO.

TUMOR sanguineus, qui suam ab arteriâ dilatatâ, sectâ aut ruptâ originem habet, *Anevryзма* nuncupatur: quod quidem in verum, spurium, & varicosum dividitur, prout sanguis vel intra parietes arteriæ ultra modum expansos continetur, vel exundans in telam circumjacentem diffluit, aut in venam vicinam è communi vulnere transfunditur, eandemque dilatat, ac varicosam reddit. De hâcce tertiâ & singulari Anevrysmatis specie, quam à se detectam, apprimè descripsit, observationibusque illustravit & confirmavit celeberrimus *Hunter* (1) tantum dicere animus est in nostro Programme, præmissâ descriptione vasorum anatomicâ, quæ in flexurâ cubiti lædi possunt.

(1) *Medical observations by a Society of Physicians in London*, vol. 1, p. 340, vol. 2, p. 390, vol. 3, p. 110, vol. 4, p. 377 & 382.

EX ANATOMIA.

ARTERIA axillaris ; cùm ad insertionem musculorum rotundi majoris , dorſique latiffimi pervenit , *humeralis* ſeu *brachialis* dicitur ; indè ad cubiti flexuram obliquè vergit. Supernè inter hos musculos & majorem pectoralem , cum venis baſilicâ & brachiali , nerviſque mediano & cubitali conjungitur ; tùm juxta anteriorem coraco-brachialis & bicipitis musculorum marginem , ſubter aponevroſim brachialem & cutem descendit ; dein brachialem muscolum & bicipitem interfluens , ſub hoc reconditur ; ibi à venâ baſilicâ diſcedens , ſolam brachialem , nervumque medianum comites aſſervat : undè ſecundùm bicipitem & brachialem muscolum , aponevroſi tegumentisſque velata reſurgit. Exindè bicipitem inter & rotundum pronatorem prolapſa , cubiti flexum aſſequitur , ibi modò anticè modò internè bicipitis tendinem attingit , ſimulque ſapiùs venæ ſeu baſilicæ , ſeu medianæ baſilicæ , aponevroſi interjectâ , firmiter ſubhæret.

In hocce ſpatio arteria brachialis multos hùc illùc ejicit ramos qui multiplicem poſt diviſionem , cum ramulis cubiti recurrentibus varias ineunt anastoſes , & in brachium penitùs diſtribuuntur. Quemdam interdùm nunc in ſupernâ , nunc in mediâ brachii parte , adèò magnum ut trunci diviſio reputari poſſit , ramum producit ; hic haud rarò cum venâ cephalicâ junctus , aponevroſi & tegumentis obvolutus , ſecundùm externum brachii latus ad ejus flexuram excurrit & ibi arteria *Radialis* dicta , cubiti musculos pervadit & irrigat. Alter aliquandò , at infrequentius , eâdem ex arteriâ exurgit ramus qui inter musculos rotundum majorem & bicipitem errat ; is modò ſubcutaneus venam baſilicam allambit , modò cubitali ſubjectus

aponevrosi, in flexu cubiti subter musculos sese recondit.

Arteria brachialis sæpè sæpiùs duobus transversis infra articulum digitis, binos in ramos finditur; hi sunt arteriæ *Radialis* & *Ulnaris*: aliàs autem sub axillâ peragitur divisio; tunc altera internum, altera externum juxta latus brachii declinat propago: quolibet in casu, multiplici sobole anastomosique repetitâ totum aspergunt brachium.

Ad flexuram cubiti tres reperiuntur venæ, cephalica, basilica, & brachialis. Cephalica vena ad medium axillaris enascitur: tum inter musculos deltoïdem pectoralemque majorem vergens, hujusce adhesionem attingit; undè aponevrosi perfossâ, subter cutem, externum bicipitis marginem semper comitatur, & cubiti flexum assequitur: tunc bipartita duos exhibet ramos. Interior cum exteriori ramo venæ basilicæ coitionem facit; est cephalica mediana quæ modò gracilis, modò magna, nervo musculo-cutaneo connexa, aponevrosim inter & cutem jacet. Exterior autem ramus tanquam cephalica continua, ad externum cubiti & ejus flexuræ latus, subter cutem progreditur, ramulis venarum medianæ communis & ulnaris, suos antrorsùm & retrorsùm emissos permiscet, & ad manum sese projicit.

È venâ axillari divisâ oriuntur basilica & brachialis; prior ceu truncus semper aponevrosim inter & tegumenta, secundùm interius brachii latus declinat, & cubiti flexuram petit; ibi ante arteriam vel ad illius oram procedit, & huic, aponevrosi mediante, non rarò connectitur, aded ut arteriæ pulsûs sit vena particeps. Deïn truncus bipartitus anteriorem emittit propaginem: illa scilicet basilica mediana, sæpiùs arteriæ, interdùm tendini musculi bicipitis, aponevrosi interpositâ, decussatim adhæret; indè cum medianâ cephalicâ communem medianam producit, quæ in anticam partem cubiti, multâ

distributione, variâque anastomosi serpit & vagatur. Interior autem propago, *cubitalis* dicta, internè juxta cubitum descendit, & ad manum protensa dispergitur.

Hæ venæ nunquam non cutem inter & aponevrosim prolabuntur, reteque vasculosum haud parvum contextunt; profunda autem vena, nempe brachialis, quæ arteriam ejusdem nominis sectatur, & ad cubiti flexuram quadripartitò diffinitur, duos arteriæ radiales, duos etiam ulnari satellites subministrat ramos, qui multiplici inter se & cum venis subcutaneis anastomosi peractâ, palmam amplectuntur.

E C H I R U R G I A.

VARIIS nominibus insignitur Aneurysma varicosum, vel venosum; à quibusdam *Aneurysma per anastomosis cum venâ* dicitur, à transitu sanguinis arteriæ vulneratæ in venam huic incumbentem & simul perfossam: ab aliis *varix Aneurysmaticus* vocatur, eò quòd sit tumor in venis cum corde synchronicè pulsans. Ut ut sit, quicumque de hâc Aneurysmatis specie disseruerunt, illam à venæ sectione tam infelicitè institutâ repetunt, ut venâ ex toto pertusâ pertundatur quoque subjacens arteria, & indè in venâ tumor oriatur.

Quomodò autem efformari possit hocce Aneurysma, facile sequentia attendenti patebit. Vix phlebotomo minùs solerter in venam & in arteriam, uno ictu, adacto, sanguis vehementer & saltuatim per venam ejicitur: cubito alligato, brevì cutis venæque commune vulnus cicatrice obducitur; illud verò quod arteriæ & venæ posterius inflictum fuit, apertum remanet; undè quædam inter hæc duo vasa nascitur anastomosis quâ sanguis arteriosus insolitum sibi prospicit iter, & in venæ parietes tantâ vi arietat, ut varicosam & pulsantem reddat,

sicque viâ breviori cum sanguine venoso ad fontem revertatur.

In quibusdam casibus, ope levioris inflammationis coadunantur, &, ut ita dicam, conferruminantur duo vasorum vulneratorum orificia, adeò ut uno foramine inosculentur; tunc tumor Aneurysmaticus in venâ tantùm apparet, & pro canalisi venosi dilatatione accipi potest. In aliis verò, & quidem rarissimis, sanguis ex arteriâ vulneratâ, si non ita detur facilis ad venam transitus, in aream textûs cellularis ambientis innititur, ipsam dilatat, & ibi parvum tumorem efformat à venâ dilatatâ vix distinguendum: *Hunter Medical. Observations, vol. 2, p. 402.*

Varia etiam discrimina reperiuntur in hacce Aneurysmatis specie, prout sanguis arteriosus in unam aut in plures venas & earum ramos irrumpit. Modò unica vena dilatur; hujus rei exemplum clar. hujusce Actûs Præses apud filium Londini vidit, cui secta basilica tumorem in ipsâ cicatrice valde prominentem, suprà & infrâ latè sensim evanescentem efformabat: modò autem omnes venæ brachii dilatantur, ut patet ex observationibus celeb. *Hunter & Cleghorn*, qui variis in subjectis & basilicam & medianam & cephalicam (hanc autem postremam ad jugulum usque) distensas & varicosas viderunt; quod quidem oriri videtur à valvularum decursu.

Ut plurimùm occurrit Aneurysma varicosum in brachio post sectas venas, vel basilicam, vel medianam, quæ arteriæ brachiali paulò supra hujusce bipartitionem, incumbunt: verùm licèt dictarum venarum incisio frequentiore huicce morbo causam præbeat, quandòque tamen à vulnere inflicto in aliâ quâcumque parte, ubi venæ super arterias decurrunt, observari potest.

Ex dictis, signa Aneurysmatis varicosi facilè desumuntur: statim atque ferrum è vulnere educitur, sanguis, prout magno cum impetu & saltu prorumpit, plùs minùsve difficulter coercetur, & primis instantibus, haud levem ecchymosim

exhibet. Sublatis fasciis, in loco vulneris ad magnitudinem avellanæ tumor exoritur, qui brevi temporis spatio increfcit ad statum quem semper servaturus est; subcutaneus videtur, circumscriptus, & si solam venam tenet, ferè oblongus, inæquali amplitudine gaudens, aut magis expansus ad locum cicatricis quàm secundùm venæ decursum; præterea pulsar arteriarum more, & sæpè tantâ donatur pulsatione, ut hæc oculo conspici queat: quin imò mollis est, prementi digito cedit, & ex toto delitescit; mox verò, ablata pressione, ad priorem statum resurgit; tandem cutis adnatæ color non immutatur; absunt etiam calor & dolor.

Aliis verùm & propriis signis rectiùs dignoscitur illud Aneurysma, scilicet; 1°. dilatatione præternaturali unius venæ, & quandòque venarum vicinarum quæ pariter varicosæ fiunt: 2°. pulsu pulsui arteriarum synchrone, inter quem sanguis strepitum edit persimilem sibilo aeris per fissuram transeuntis, seu, juxta celeberr. *Hunter*, cum sono ultimo litteræ R à quibusdam in pronunciando nimis protractæ, comparandum; præter hunc pulsum, adest in tumore & in propioribus venis motus tremulus haud ægrè perspiciendus. Quæ quidem signa auctoritate summorum virorum maximè nituntur. Illustriss. *Hunter*, in hanc Aneurysmatis speciem imprimis attentus, ut de genuinâ mali naturâ certiores se redderet, in duabus ægris quas hoc morbo laborantes ipsi videre contigit, quædam experimenta coram peritis in arte Magistris, & ad annum 1773 præsentem clariss. hujusce Actûs Præsides instituit; hæc paucis commemorare haud supervacaneum ducimus.

Sex ante annos circiter, in sectione venæ basilicæ, arteria subiecta simul læsa fuerat, apud filiam jam memoratam (pag. 5) cujus in brachio statim tumor Aneurysmaticus ad avellanæ magnitudinem ortus fuit; tum ad tres nimirum pollices extensa erat
supra

supra & infra cubiti flexum, secundum venæ basilicæ tractum: nec mediana, nec cephalica intumescabant, dum in aliis ægris hæ venæ multò crassiores aut varicosæ redduntur: pulsatio & motus tremulus in basilicâ valdè tumidâ tactu levissimo percipiebantur, & aure admotâ, audiebatur quidam strepitus qui, arteriâ ad mediam humeri partem compressâ, omninò cessabat. Pendulo brachio, tumor longè expansus ac durior; elato, detumescibat ac mollior fiebat: repetitâ supra cubitum arteriæ compressione, prorsùs sivebat, quamvis nullus digitorum pressus in venis sursum exerceretur; cessante verùm compressione, sanguis illicò ad basilicam tendens, illam magnoperè distendebat, licèt brachium elatum esset. Si rursùs ad locum memoratum, arteria seorsùmque venæ varicosæ antea collapsæ pars superior comprimerentur, tum pedetentim renascebatur tumor; sed nec eâdem amplitudine, nec eodem renixu, nullâque pulsatione ac succussu tremulo donabatur; mox digito qui separatim venam premebat, sublato, & brachio sursum elato, iterùm desidebat: verùm ad priorem revertebatur statum cum pulsu motuque tremulo, simul atque omnis arteriæ pressus remittebatur. Demùm ligaturâ infra tumorem venosum ità cubito injectâ, ut arteriæ pulsus ad carpum non perentiretur, peractis simul in ipsum tumorem, ab inferioribus ad superiora, levioribus & alternis compressionibus, alternatim collabebatur & recrudescibat.

Alter casus circa mulierem versatur, cui quatuordecim abhinc annis, basilica & arteria phlebotomo sectæ fuerant; brevi tempore in lucem prodiit tumor Aneurysmaticus, cujus hæc erant symptomata. Omnes cubiti venæ, & imprimis basilica, ad duos pollices supra & infra articulum valdè tumescebant. Tum sive prope locum vulneratum cubitus ligaturâ constringeretur, sive non, modò à compressione adhibitâ collabe-

bantur venæ, vix autem cessante, turgescabant; modò etiam venarum diameter minuebatur, cum arteriæ foramen obduceret premens digitus, quo remoto, expandebatur. Cubiti flexum occupabat tumefactio, & arteriæ tractum consequebatur. Hæc arteria amplitudine insolitâ, pulsuque fortiori vivebat; venæ varicosæ arteriarum more vibrabantur, & sibilo ac motu tremulo afficiebantur fortiori ad locum incisum, supra & infra paulatim evanescente.

Similia & partim alia experimenta fuerunt instituta à clarissimo *Cleghorn* in juvene qui, sectâ pariter venâ basilicâ & arteriâ humerali, *varice*, ut vocat, *Aneurysmatico* corripiebatur. Tumor ad magnitudinem avellanæ primùm evectus, in posterum non increvit; venæ vicinæ etiam ultra modum erant expansæ. Pulsatio & concussio tremula cum strepitu in basilicâ manifestæ, in medianâ debiliores, omnium minimæ in cephalicâ, quæ tamen valdè tumida ad claviculam usque, varicem mentiebatur. Pendulo brachio, venæ tumefactæ longè crassiores videbantur; sublato verum eodem, tumor venarum desidebat. Pulsatio cum motu tremulo planè cessabat in cephalicâ, obscura erat in medianâ, dum interim perstaret in basilicâ. Ad brachium aure admotâ, strepitus sicut & pulsationes, facile distinguebantur, & multò facilius, quandò specillum ferreum, alterâ extremitate tumori incumbens, alterâ inter dentes retinebatur, vel applicabatur auri; ille quidem strepitus adeò sufflabat, ut æger in lecto jacens, cubito propè caput strato, somnum capere non posset. Digiti apice basilicam venam ad sectionis locum fortiter premente, persentiri potuit arteriæ pertusæ foramen, & præsertim saltus sanguinis ex arteriâ in venam: quâ continuatâ pressione, ita ut obturaretur foramen, & transfusio sanguinis impediretur, pulsatio in cæteris venis evanuit, illarumque diameter fuit imminuta. Si vel humeralis,

vel subclavia comprimeretur arteria, ad naturalem statum restituebantur venæ; finito verum pressu, mox tumidiores apparebant. Demum hoc singulare quod celeberrimum *Hunter* non effugerat, observavit *Clar. Cleghorn*, scilicet arterias supra locum affectum dilatatas & fortius pulsantes, infra verò debiliori pulsu donatas, & angustiores quàm in illæso lateris oppositi brachio. *Medical observ. vol. 4, pag. 110.*

His quidem observationibus & experimentis ritè perpensis, jam sat præclara datur Aneurysmatis varicosi diagnosi, ut nec pro Aneurysmate tum vero, tum spurio, nec pro varice habeatur: distinguitur enim ab Aneurysmate vero, quia sanguis intra parietes arteriæ contentus, ipsam dilatat, & ad tumorem extollit; à spurio differt, propterea quòd sanguis ex arteriâ lassâ in telam cellularem effunditur, & ibi tumorem producit; cum varice demum quæ duntaxat venæ præternaturalem offert dilationem, confundi non potest: insuper in Aneurysmate seu vero, seu spurio desunt venarum pulsus & dilatatio; in varicibus nulla occurrit pulsatio.

Quoad Aneurysmatis varicosi prognosim, si tumor non turbetur, nihil mali portendit. Etenim brevè ad certam magnitudinem increscit ultra quam ampliùs procedere non solitus est; ut in homine cui tertio die post phlebotomiam exorta fuit illius Aneurysmatis species; quæ à primis temporibus fuit tumoris magnitudo, eadem quinque annis postea perstabat, quando clarissimum *Hunter* adiit æger. Sic quoque in muliere quam hoc malo correptam ille videbat, quatuordecim abhinc annis, hoc solum immutatum observavit, venam scilicet arteriæ incumbentem, paulò magis dilatatam. Minus igitur periculum minatur istud Aneurysma, quàm verum & spurium, quæ sæpiùs de die in diem crescunt: unicum incommodum secum affert, quòd in latus affectum lecto incumbere non possit æger, quia stupor

molestus à compressione venarum in toto brachio percipiatur.

Cùm ægotantem in vitæ discrimen non adducit Aneurysma varicosum, fidenter sibi met ipsi committendum est; caveatur modò ne compressione versùs axillam obex ponatur venoso sanguini. Si verò fortè tumor aut vena in majorem molem increscunt, manica seu brachialis fascia laqueis illigata molliterque conftricta, adhibeatur. Plena tamen hujus morbi à principiis per compressionem curatio sequenti modo tentari potest.

Primùm digiti manûs singuli fasciolâ obligantur; altera in manum & inferius brachium ad illius flexuram circumducitur; dein super densum atque quadratum pulvillum loco vulneris arteriæ impositum, duo decussantur splenia, quæ plurimis fasciæ gyris firmiter alligantur: humero quoque juxta decursum arteriæ humeralis, spissus & oblongus adnectitur pannus qui sanguinis fluxum paululùm coerceat: alia tandem, sed longior & latior fascia, ab infimo ad summum circumvolvitur brachium, quibus peractis, ægrum lecto jacentem ita collocare decet, ut brachium leviter flexum, supposito pulvinari molliùs fulciatur.

Hæc vinctura nisi decem aut duodecim post diebus resolvitur, & iterùm atque iterùm adducitur usque ad perfectam morbi sanationem: interdùm vel spiritu vini, vel poscâ conspergitur brachium. Sanguinis detractio etiã repetita, diæta tenuis, corporis & animi quies non sunt omittenda. Quæ simplex & facilis curandi methodus, juxta clarum *Guattani* bene atque feliciter evenit.*

* Leg. Histor. 42. pag. 178. in ejus libro de Aneurysmatibus externis. Roma, 1772.

